

دانشنامه طب سوزنی و موارد کاربرد آن



مطلوب موجود در این دانشنامه

مقدمه
درد پشت
سندرم تونل کارپال
آلرژی دارویی
فیبرومیالژی
آلرژی غذایی
سردرد
سندرم پیش از قاعده
پلی میوزیت

طب (Acupuncture) یکی از اشکال، طب چینی بوده که قرن هاست برای درمان مشکلات مختلف سوزنی مورد استفاده قرار می گیرد.

طب سوزنی براساس این نظریه استوار شده که انرژی در داخل و بیرون بدن و درون راههای کانالهای انرژی می گویند جریان دارد طب سوزنی شامل فروکردن سوزن های بسیار نازک در پوست و برروی نقاط استراتژیکی و حیاتی بدن می شود و بیشتر برای درمان درد مورد استفاده قرار می گیرد

پژوهشکان طب سوزنی کار معتقداند زمانی فرد بیمار می شود که چیزی مسیر (chi) را بلوکه کرده حرکت انرژی و یا تعادل آن را برهم زده باشد.

آنها معتقداند طب سوزنی کمک می کند که مسیر بلوکه شده برداشته شود و یا تعادل انرژی در بدن به شکل اول برگردد.

برخلاف این نظر، بیشتر پژوهشکان غربی معتقداند که طب سوزنی با فشار برروی نقاط خاص باعث تحریک اعصاب، ماهیچه ها و بافت های همبند می شود.

این تحریک ها باعث افزایش ترشح مسکن های طبیعی بدن و همچنین افزایش جریان خون در بدن می شود

بعد از معاینه توسط پزشک طب سوزنی کار، وی نقاط بلوکه شده و یا دارای مشکل در بدن شما را مشخص می کند.

مشکل در هر نقطه ای از بدن باعث ابتلا به بیماری خاصی می شود. بعد از اینکه پزشک نقاط مشکل دار را یافت

شروع به فروکردن سوزن در پوست شما می نماید. هرچند روش هر پزشک طب سوزنی کار با دیگری متفاوت است، اما معمولاً این درمان بین ۱۵ دقیقه تا یک ساعت طول کشیده و ممکن است، نیاز به چند جلسه درمان و یا مراجعه منظم و همیشگی به پزشک باشد
ممکن است هنگام داخل رفتن سوزن، فشار کمی احساس نمایید.

در اکثر افراد این فشار درد آور و ناراحت کننده نیست.

ناحیه ای که سوزن فرو رفته ممکن است سوزن سوزن شده، بی حس شده، خارش داشته و یا درد کمی داشته باشد.

طب سوزنی کار ها معتقداند این احساس نشانه ای از آزاد شدن انرژی در بدن می باشد
بعد از اینکه سوزن وارد شد، طب سوزنی کار ممکن است سوزن را کمی جلو عقب کرده یا جریان گرمای یا الکتریسیته به آن وارد نماید

افراد برای درمان درد و همچنین درمان بعضی از انواع بیماری های خاص از طب سوزنی استفاده می کنند

شما می توانید از طب سوزنی به عنوان درمانی کامل و یا در کنار سایر درمان ها استفاده نمایید.

تحقیقات

موارد استفاده از طب سوزنی

درشیمی درمانی برای درمان تهوع و استفراغ

درد بعد از جراحی

درمان مشکلات بعد از سکته مغزی، که شامل بازگرداندن مهارت هایی که فرد در نتیجه آسیب سکته

درمان سردرد

گرفتگی های ناشی از قاعده

درمان فیبرومیالژیا (Fibromyalgia)، یا درد خشکی گستردۀ ماهیچه ها و بافت های نرم بدن

درمان درد ناشی از گرفتگی عضلات

درمان درد ناشی از آرتروز (Osteoarthritis) و بهبود عملکرد مفصل آرتروزی

درمان درد کمر، در افرادیکه مبتلا به کمر درد هستند،

درمان مشکل کارپال تونل (Carpal tunnel)

درمان آسم

خطرات طب سوزنی شامل

در صورتیکه بیمار مبتلا به اختلال خونریزی دهنده است، خطرناک می باشد

در صورتیکه بیمار از داروهای رقیق کننده خون استفاده می کند، خطرناک می باشد

ممکن است خونریزی، کبودی و درد درجاییکه سوزن فرو می رود، ایجاد می شود

ممکن است سوزن شکسته و به یکی از اندام های داخلی آسیب برساند (بسیار نادر)

سوزن استریل نشده می تواند بیمار را آلوده کند

اگر عمیقا وارد قفسه سینه و یا قسمت بالایی پشت شود، امکان خوابیدن ریه ها وجود

دارد

کمردرد

کمردرد از اختلالاتی است که طب سوزنی در آن سودمند است.

کمر درد یکی از شایعترین علل مراجعه بیماران به مراکز درمانی می باشد بطوریکه بعد از سرماخوردگی و ضربه های کوچک،

کمر درد شایعترین بیماری در انسان است.

کمر درد نخستین علت مراجعه بیماران به متخصصین ارتوپدی و جراحی مغز و اعصاب و بطور کلی کمر درد سومین علت مراجعه به پزشک است.

کمر درد بیش از ۹۰ درصد افراد را در طول زندگی حداقل یکبار دچار می سازد. و بیش از ۵۰ درصد از افراد بیش از یک مرتبه دچار آن کمر درد می شوند

علل بسیار متفاوتی می توانند سبب ایجاد کمر درد شوند. تقریباً "در ۸۵ درصد از افرادی که برای کمر درد معاینه و بررسی می شوند علت خاصی پیدا نمی شود

بیش از ۹۰ درصد افرادی که دچار کمر درد میشوند طی ۲ ماه بهبود می یابند. تا حدود ۲۰ سال قبل،

اکثر افرادی که برای درمان دردهای عضلاتی اسکلتی به درمانگاههای فیزیوتراپی و ارتوپدی مراجعه می کردند،

افراد بالای ۵۵ تا ۶۰ سال بودند و در واقع تخریب غضروف مفصلی در سنین بالا شروع می شد،

ولی امروزه این سن به ۳۰ سال کاهش پیدا کرده و پزشکان شاهد مراجعه بیمارانی با سنین

۳۰ تا ۵ سال با دردهای گردن، زانو، کمر و مفاصل مختلف به مراکز درمانی هستند
انواع کمر درد

کمر درد از نظر ماهیت درد به سه دسته تقسیم می شود
کمر درد گذرا : دردی ناگهانی و شدید در ناحیه کمر، این نوع کمر درد ناشی از انجام حرکات

نامناسب و یا کشیدگی بیش از حد ستون فقرات است.

هر چند که این کمر درد گذرا است اما هیچگاه نباید کم اهمیت شمرده شود، چرا که میتواند اخطاری برای عود مجدد آن باشد ”و سریعا

باید جهت جلوگیری از تکرار کمر درد اقدام شود

کمر درد حاد: یک درد حاد در ناحیه کمر است، این نوع کمر درد در اثر قرار گرفتن در وضعیتهای غلط، خم شدنها و مکرر

و به مدت طولانی و یا ضربه به ستون فقرات کمری ایجاد

می شود. کمر دردی که کمتر از یکماه از شروع آن می گذرد را حاد می نامند
کمر درد مزمن: کمر دردی که بیش از یکماه از بروز آن می گذرد را کمر درد مزمن
می نامند.

کمردرد مزمن در واقع در اثر عدم درمان و یا مقاومت به درمان کمر درد حاد
ایجاد می گردد

کمر درد مکانیکی
شامل آن دسته از بیماریهایی هستند که در اثر و یا به واسطه یک عامل مکانیکی مانند
ضربه،

حرکات فیزیکی نامناسب، کم بودن قوام عضلات و یا فشار بیش از حد به ناحیه ستون
فقرات کمری

و در اثر بد قرار گرفتن وضع بدن در حالت نشسته و ایستاده ایجاد می گردند.

این دسته از بیماریها

90 درصد از علل کمر درد را تشکیل می‌دهند و نکته جالب اینکه براحتی قابل

پیشگیری هستند

علل غیر مکانیکی کمردرد شامل آن دسته از علل طبی و یا بیماریهای سیستمی هستند
که در سیر

بیماری به طرق مختلف ممکن است باعث کمردرد شوند و تشخیص و درمان این
بیماریها تماماً "به عهده پزشک معالج شما می‌باشد"

شایعترین علل طبی عبارتند از : بیماریهای التهابی، بیماریهای عفونی، سرطانها،
و بیماریهای متابولیکی و مسمومیت با فلزات سنگین رادیوم

درد پشت از موارد کاربرد طب سوزنی است

risk factor of back pain

ریسک فاکتور درد پشت

چاقی obesity

ضعف نون عضلات poor muscle tone

سیگار کشیدن smoking

وضعیت بد bad posture

درد پشت از موارد کاربرد طب سوزنی است

Symptom of back pain

علایم درد پشت

درد پشت back pain

درد پا leg pain

درد بازو arm pain

حساسیت پشت back tenderness

References

1. Braunwald E, et al. **Harrison's principles of internal medicine.** 15th ed. New York: McGraw-Hill; 2001; pp. 238-459.
2. Beers Mh, Berkow R. **The Merck manual of diagnosis and therapy.** 17th ed. Whitehouse Station, NJ: Merck and Co 1999; 46-80.
3. Friedman LS. **The Liver, Biliary Tract, and Pancreas.** In: Tierneryed. New York, NY: McGraw-Hill 2000; 656-97.

سندروم تونل کارپال

سندروم تونل کارپال از مواردی است که طب سوزنی سودمند است

سندروم تونل کارپال یا کانال مج دستی بیماری است که به علت فشار به عصب مدیان هنگام عبور از درون تونل مج دستی ایجاد میشود

در مج دست مgra و تونلی وجود دارد که به آن کانال کارپال یا تونل مج دستی میگویند.

از زیر رباط عرضی مج دست 9 تاندون و یک عصب مدیان (به رنگ زرد)

عبور میکند

ترکیب این دو ساختمان یعنی از یک طرف مجموعه استخوانچه های مج دست و از طرف دیگر رباط عرضی مج دست یک کانال یا تونل را میسازد.

از درون این کانال 9 تاندون خم کننده انگشتان دست و عصب مدیان یا میانی عبور

میکند.

این تاندون ها و عصب از ساعد پایین آمده و از داخل تونل عبور کرده و به کف دست میرسند.
عصب مدیان

سپس در کف دست به شاخه هایی تقسیم شده و حس کف دستی انگشتان شست و سبابه و میانی و نیمه خارجی

انگشت انگشتی و همچنین حرکات عضلات ناحیه تنار را تامین میکند

عصب مدیان یک عصب حسی و حرکتی است. این عصب مسئول حس دادن به انگشتان شست و سبابه و میانی و نیمی از انگشت انگشتی و حس کف دست است.

این عصب همچنین موجب تحریک عضلات برجستگی تنار
میشود.

برجستگی تنار در کف دست و در مجاورت انگشت شست بوده و حاوی عضلاتی است که شست را حرکت میدهند

گاهی اوقات بنا به علی فضای درونی این کانال تنگ میشود. بطور مثال وجود یک تومور یا کیست در درون کانال میتواند فضای آن را تنگ کند
و یا بد جوش خوردن یک شکستگی مج دست میتواند موجب تغییر شکل استخوان شده و فضای کانال را تنگ کند.

ولی در غالب اوقات علت کاهش فضای تورم تاندون ها خم کننده انگشتان و غلاف اطراف آنها است که از درون این فضای عبور میکنند

این تاندون ها میتوانند به علت حرکات مکرر و مداوم مج دست و انگشتان متورم شوند.

کارهایی مانند تایپ زیاد و

یا استفاده زیاد از پیانو میتوانند موجب بروز علائم سندورم کانال کارپ شوند.

گاهی اوقات تورم تاندون ها و غلاف آنها له علت تغییرات هورمونی

در دوران بارداری یا یانسگی برای بیمار ایجاد میشود

سندروم تونل کارپال از موارد کاربرد طب سوزنی است

Symptom of carpal tunnel Syndrome

علایم سندروم تونل کارپال

درد pain

ضعف دست weakness in hand

آسیب انگشت finger damage

REFERENCES:

- 1.Maltby JR, Pytka S, Watson NC, Cowan RA, Fick GH. Drinking 300ml of clear fluid two hours before surgery has no effect on gastric fluid volume and PH in fasting and non-fasting obese patients. Can J Anaesth 2004; 51: 111-5.**
- 2.Brady M, Kinn S, Stuart P. Preoperative fasting for adults to prevent perioperative complications. Cochrane Database Syst Rev 2003; 4:4423.**

آلرژی دارویی

آلرژی دارویی از مواردی است که طب سوزنی در ان مفید است.

آلرژی دارویی باعث ایجاد واکن شهای خاص آلرژیک به داروها یا درما نها می شود.

آلرژیهای دارویی با عوارض جانبی داروها متفاوتند، و این تفاوت

برخی از داروها بیشتر با واکنش های آلرژیک مرتبطند. دکترها این موضوع را در هنگام تشخیص
آلرژی دارویی در مد نظر قرار میدهند

در عین حال چند مورد پرهیز وجود دارد که مردم باید برای اجتناب از واکنش های آلرژیک مرااعات
کنند.

سیستم ایمنی بدن دارو یا مواد دارویی را با چیزهای مضر مثل فارچ، ویروس، یا باکتری اشتباه
میگیرد، و این سبب بروز آلرژی دارویی می شود

در وضعی تهای نرمال، سیستم ایمنی با رها کردن آنت بیاد یهایی مثل هیستامین و گلبو لهای سفید
خون برای مقابله با هر ارگانیسم مهاجم و مضر وارد عمل میشود.

آنتبیاد یها تهدید را منزوی و محو میکنند، و در نتیجه بدن به وضعیت نرمال خود برمیگردد
در مورد واکنش آلرژیک به یک دارو یا مواد دارویی، سیستم ایمنی، دارو را با مهاجم مضر اشتباه
گرفته و به دارو حمله م میکند

این اشتباه به بروز واکنش آلرژیک منجر م میشود
علایم واکنش آلرژیک به دارو یا مواد دارویی م میتواند شامل موارد زیر باشد

اگرچه مورد نادري است، اما واکنشهای آرژيک شديد به داروها م میتواند به آنافيلاکسي نيز منجر شود، كه نوعي واکنش آرژيک جدي و بعضاً

كشنده محسوب م يشود. عاليم آنافيلاکسي عبارتند از تورم در ناحيه گلو، دهان و صورت .

بروز را شها يا كهيرهای شديد .

احساس خراشيدگي يا ب يحسی در ناحية گلو .

تهوع و استفراغ .

درد يا گرفتگي عضلات شکم .

افت يا خيرش ناگهاني فشار خون .

گيجي يا از دست رفتن حس خودآگاهاهي .

هر کسی که دچار این عالیم شده باشد نیازمند توجهات پزشکی اورژانسی است. آنافيلاکسي در صورت عدم درمان فوري م میتواند کشنده باشد

بروز را شهایی مثل کهیر .

خارش پوست يا چشم .

تب .

ورم .

خس خس سینه .

تنگی نفس یا دشواری در تنفس .

علایم آرژی ناشی از دارو اغلب چند ساعت تا دو هفته پس از مصرف دارو احساس می شود.

خلاف واکنشهای آرژیک، عوارض جانبی ناشی از دارو عمومیت دارد.

عوارض جانبی داروهای مختلف بسیار متفاوتند، و به مشخصات خاص هر

دارو بستگی دارند

علایم، طیفی از خفیف تا شدید را شامل می شود، و اغلب اوقات این علایم به علایم ناشی

از آرژ یها شبیه نیستند

هر فردی در صورتی که در هنگام مصرف دارویی دچار عوارض جانبی ناشی از مصرف آن

می شود باید در مورد عوارض جانبی داروهای مصرفی خود بررسی کند

عدم تحمل نسبت به یک دارو شکل دیگری از واکنش است که ناشی از آرژی یا عوارض جانبی

نیست. عدم تحمل معمولاً به معنی میزان حساسیت بدن نسبت به یک داروی خاص است

بدن ممکن است در پردازش یک یا دو پروتئین موجود در دارو دچار مشکل باشد، و این موضوع

ممکن است بسته به نوع دارو سبب بروز علایم خاصی شود

داروهای شایع در واکنشهای آرژیک

از نظر تکنیکی برای اغلب داروها امکان ایجاد واکنش آرژیک وجود دارد.

به هر جهت، برخی داروها و مواد دارویی هستند که بیش از بقیه سبب بروز واکن شهای آرژیک میشوند

شایعترین داروهای مسبب ایجاد واکن شهای آرژیک عبارتند از آسپیرین .

داروهای غیر استروئیدی ضد التهابی • (NSAIDs)

آنی بیوتی کهایی مثل پن یسیلین .

داروهای شیمی درمانی .

انسولین .

داروهای ضد تشنج مورد استفاده برای درمان تشنج .

مردم بیشتر محتمل است که چار واکنش آرژیک به دارویی باشند که به پوست تحویل شده یا به بدن تزریق میشود.

در بسیاری از موارد، آرژیکی دارویی را میتوان با خودداری از مصرف داروی مشخص که سبب بروز علائم آرژی می شود، درمان کرد.

اغلب داروها دارای جایگزی نهایی هستند که همان خواص درمانی را در خود دارند

آلرژی دارویی از موارد کاربرد طب سوزنی است

causes of drug allergy

علل آلرژی دارویی

aspirin آسپرین

NSAID ضد التهاب غیر استروئیدی

شیمی درمانی chemotherapy

استروئید steroid

آلرژی دارویی از موارد کاربرد طب سوزنی است

Symptom of drug allergy

علایم آلرژی دارویی

difficult breath تنفس سریع

swelling tongue تورم زبان

swelling thorate تورم راه هوایی

dizziness سرگیجه

vomiting تهوع

Reference

medicalnewstoday.com

Drug allergies: What you need to know

Written by Jon Johnson Reviewed by Alan Carter, PharmD

Last reviewed: Thu 15 June 2017

فیبرومیالژی

فیبرومیالژی از موارد کاربرد طب سوزنی است.

Fibromyalgia

بیماری است که مشخصه آن درد در بسیاری از نقاط بدن همراه با احساس خستگی

است فیبرومیالژی یک بیماری مزمن است.

بیماری فیبرومیالژی در دو درصد مردم دیده میشود. در زنان هفت برابر شایعتر از مردان بوده
بطوریکه بیش از 80درصد دیده میشود.

خانمهای بیماربیشتر در سنین 55-25 سالگی هستند

علت فیبرومیالژی به درستی شناخته شده نیست. تحقیقات نشان داده که بیماران مبتلا به
فیبرومیالژی دچار تغییرنوروترانسミترها در مغز و اعصاب میشوند.

نوروترانسمیترها نوروترانسمیترها مواد شیمیایی خاصی

هستند که نوسط اعصاب تولید شده و نقش مهمی در انتقال پیام های عصبی دارند

در این بیماری مقدار نوروترانسمیتر بنام سروتونین Serotonin

در مغز کم میشود.

فیبرومیالژی از موارد کاربرد طب سوزنی است

Symptom of fibromyalgia

علایم فیبرومیالژی

pain درد

tenderness حساسیت

memory damage آسیب حافظه

sleep problem مشکلات خواب

فیبرومیالژی از موارد کاربرد طب سوزنی است

causes of fibromyalgia

علل فیبرومیالژی

injury جراحت

trauma ترورما

آرتریت روماتوئید

stress استرس

depression افسردگی

Reference

1- Stoelting R., Dierdorf S., Anesthesia

and co-existing disease, 3rd ed.,

New York, Churchill Livingstone, 1993, pp:

137-148.

2- Choi, Jong-Ho, MD Rooke, G. Alec, MD

PHD. Reduction in Post-intubation respiratory

resistance by isoflurane and Albuterol, Canadian

journal of Anesthesia, July 1997, 44, (7): 717.

آلرژی مواد غذایی

آلرژی مواد غذایی از موارد کاربرد طب سوزنی است.

آلرژی غذایی عبارت است از واکنش بیش از اندازه‌ی دستگاه ایمنی به برخی غذاها یا موادی که معمولاً بی خطرند

این واکنش‌های نامطلوب ممکن است، ارثی یا ناشی از یک نقص اکتسابی بیوشیمیایی باشند.

علایم ممکن است

در عرض چند دقیقه یا 2 ساعت پس از خوردن آن غذای به خصوص بروز کنند. در بعضی موارد، امکان دارد علایم

1-2. روز بعد نیز ظاهر نشوند

علایم شایع

اسهال (شایع است)

درد شکمی (شایع است)

بثورات پوستی

نفخ و باد شکم (شایع است)

کهیر

تورم صورت (به خصوص لب ها)

خارش

تورم دست ها و پاها

آسم

تهوع و استفراغ

مواد غذایی آرژی زا

هرگونه غذا یا ماده ای که بلعیده می شود، می تواند باعث بروز واکنش آرژیک شود.

غذاهایی که بیشتر باعث این

حالت می شوند، عبارتند از: شیر گاو، تخم مرغ، گندم، سویا، بادام زمینی، ماهی، آجیل مثل گردو و

فندق، خربزه، کنجد، تخمه‌ی آفتاب گردان و شکلات

: پیشگیری

غذاهای ایجاد کننده‌ی آرژی را در خود شناسایی نمایید و از مصرف آنها پرهیز کنید

معلوم شده شیرخوارانی که غذای جامد برای آنها دیرتر شروع می شود، کمتر به آرژی غذایی دچار می شوند.

- آرژی غذایی در شیرخواران معمولاً بعد از 2 سالگی برطرف می شود
بزرگسالانی که به بعضی از غذاها (به خصوص شیر، ماهی یا آجیل) آرژی دارند، با
احتمال بیشتری این آرژی را برای سال ها حفظ می نمایند

آرژی غذایی از موارد کاربرد طب سوزنی است

Symptom of food allergy

علایم آرژی غذایی

rapid breath تنفس سریع

headache سردرد

diarrhea اسهال

breath problem مشکلات تنفسی

runny nose ترشح بینی

eczema اکرمایما

HIVE کهیز

Reference

**1- Anesthesia / edite by Ronald D., Miller, 5th
ed vol, 1,2, Churchill livingston 2000, PP: 2220-
2221.**

**2- Jun Tang, MD., Robert D., Angelo, MD.,
paul F., White, PHD FANZCA, et al., the
efficacy of RS. 25259, a long-acting selective 5
HT3 Receptor Antagonist, for preventing
postoperative Nausea and vomiting after
Hysterectomy procedures. Anesth Analg 1998,
87: 462-7.**

سردرد

سردرد از مواردی است که طب سوزنی در آن مفید است.

در برخورد با بیمار سردرد به این نکات توجه شود

سن بیمار: اوج پیدایش نشانه های میگرن در ۲۰ تا ۳۵ سالگی است.

آرتربیت تمپورال تقریبا همیشه پس از ۴۵ سالگی بروز می کند.

سردردهای ناشی از تومورهای مغزی در میانسالی

و بیشتر سردردهای مزمن روزانه در سنین جوانی روی می دهد

جنس بیمار: شیوع میگرن در زنان چند برابر مردان است و بر عکس سردردهای کلاستر در مردان بیشتر دیده می شود

محل درد و چگونگی آغاز سردرد

کیفیت درد و طول مدت درد

عوامل تشدید کننده به وجود آورنده سردرد و عوامل تسکین دهنده

نشانه های همراه

سابقه خانوادگی و مصرف دارو

میگرن شایعترین نوع سردرد بوده، عمدها به تدریج شروع می شود، معمولاً یک طرفه است و ۴ تا ۷۲ ساعت طول می کشد.

با زمینه ارشی خانوادگی از هنگام کودکی و با احتمال دوره های تهوع و استفراغ همراهی دارد

شروع میگرن می تواند از ناحیه گیجگاهی، پیشانی یا پشت سر باشد. اغلب افراد میگرنی شخصیتی وسوسی و تحريك پذیر دارند

معیار تشخیص میگرن موارد زیر هستند:

سردرد یک طرفه، کیفیت ضربان دار، شدت متوسط یا شدید، تشدید سردرد با راه رفتن و انجام فعالیت های روز مره که

حداقل یکی از موارد تهوع- استفراغ یا هر دو و یا ترس و گریز از نور یا صدا را دارد

سردرد خوشه ای

با شیوع بیشتر در مردان، معمولاً یک طرفه با کیفیت شدید و تیر کشنده، حدود ۳۰ تا ۱۸۰ دقیقه طول می کشد. پیدایش آن معمولاً نیمه شب و آغاز صبح است و

بیمار بیقرار است، نشانه های گرفتاری عصبی خود کار به طور شایعی دیده می شود. مثلًا اشک ریزش، پر خونی ملتحمه، احتقان و آبریزش بینی، برافروختگی چهره و گاهی سندروم هورنر

سردرد مزمن روزانه **Tension Headache**

ممولاً دو طرفه و شایع است. غیر ضربان دار، بدون تهوع و استفراغ، معمولاً افسردگی و اضطراب نقش بارزی در این نوع سردرد دارد. پیدایش این سردرد بیشتر

در میانسالی است

همچنین سردرد دارویی MAOI استفاده مزمن و نادرست ضد درد ها ، هیپوکسی ، هیپرکاپنه ، و توکسیک یا متابولیک ، نیترات ها و نیتریت ها ، داروهای

L P

هیپوگلیسمی ،

سمومیت منواکسید کربن ،

سندروم قطع الکل ،

فشار خون بد خیم ،

پراکلا مپسی ،

فُوكروموسیتوما ،

تب ،

درد ارجاعی از دندان ،

درد ارجاعی گوش و ... از سایر عوامل مهم ایجاد کننده سردردهای شدید هستند

سردرد از موارد کاربرد طب سوزنی است

causes of headache

علل سردرد

stress

muscle tension

dental problem

eye problem

nerve damage

dehydration

menangitis

References

1. Zawadzki JK, Dunaif A. Diagnostic criteria for polycystic ovary syndrome: towards a rational approach. Boston: Blackwell Scientific; 1992. p. 377-84.
2. Homburg R. What is polycystic ovarian syndrome? A proposal for a consensus on the definition and

diagnosis of polycystic ovarian syndrome. Hum Reprod 2002; 17: 2495-9.

3. The Rotterdam ESHRE/ASRM-Sponsored PCOS consensus workshop group. Revised 2003 consensus on diagnostic criteria and long-term health risks related to polycystic ovary syndrome (PCOS). Hum Reprod 2004; 19: 41-7.

سندرم پیش از قاعده

سندرم پیش از قاعده از موادی است که طب سوزنی مفید است.

سندرم پیش (PMS) مجموعه‌ای از علایم جسمی، روانی و احساسات مرتبط با چرخه قاعده در از قاعده زنان است.

این علایم شامل نوسانات خلقی، حساس شدن پستان‌ها، هوس خوراکی، خستگی، کج خلقی و افسردگی می‌شود. تخمین زده می‌شود که از هر ۴ زنی که در دوران قاعده قرار دارند، ۳ تای آنها این سندرم را تجربه می‌کنند.

بعضی از زنان در ۲۰ سالگی دچار این سندرم شده، در حالیکه بعضی دیگر در اوآخر و ۴۰ سالگی دچار این مشکل می‌شوند. این سندرم معمولاً در الگوی همیشگی و قابل پیش‌بینی ظاهر می‌شود.

در بعضی ماهها ممکن است علایم آن شدیداً سخت بوده و در سایر مواقع عادی بوده و یا حتی بسختی قابل تشخیص شود.

با اینحال شما مجبور نیستید که اجازه دهید این مشکل زندگی شمارا کنترل نماید، چراکه با تغییرات سبک زندگی و درمان می‌شود، این بیماری را کنترل و مدیریت نمود

علایم و نشانه های سندروم پیش از قاعده‌گی به دو دسته جسمی و روحی تقسیم می‌شوند

معمول‌ترین علایم روحی شامل

تنش یا اضطراب

خلق افسرده

هجوم گریه

نوسانات خلق و خو و تحریک پذیری یا خشم

تغییرات اشتها و هوس‌های غذایی

مشکل در به خواب رفتن (بی خوابی)

تمرکز ضعیف

و علایم جسمی شامل

درد مفاصل و یا عضلات

سردرد

خستگی

افزایش وزن بدلیل احتباس مایعات

نفح شکم

حساسیت به لمس پستان

جوش زدن

اسهال یا بیوست

درمان سندرم پیش از قاعده‌گی

پژشک شما می‌تواند یک یا چند دارو برای درمان و کنترل سندرم پیش از قاعده‌گی تجویز نماید.
موفقیت درمان دارویی بسته به افراد مختلف متفاوت است.

داروهایی که معمولاً برای این بیماری توصیه می‌شوند،

شامل

داروهای ضدافسردگی. داروهای مهار کننده انتخابی بازجذب سروتونین (SSRIs) از قبیل فلوکستین
پاروکستین سرتالین

بهبود علیمی همچون خستگی، هوس‌های غذایی و مشکلات خواب موثر بوده اند و جزء اولین
انتخاب‌ها برای درمان انواع شدید سندرم پیش از قاعده‌گی می‌باشند.

این داروها معمولاً روزانه تجویز می‌شوند

اما در بعضی زنان مصرف این داروهای محدود به دوهفته قبل از شروع قاعده‌گی است
داروهای ضد التهابی غیر (NSAIDs). مصرف داروهایی همچون ایبوپروفن یا ناپروکسن در
استرونئیدی

شروع دوره می‌تواند به بهبود گرفتگی عضلات و ناراحتی پستان‌ها کمک نماید
زمانیکه با ورزش و محدود کردن مصرف نمک نمی‌شود میزان آب اضافی
دیورتیک‌ها

بدن را کاهش داد، از این نوع دارها برای خارج کردن آب حبس شده در بافت های بدن و کاهش نفخ و ورم استفاده می شود

قرص های ضد بارداری (Oral contraceptives). این داروها تخمک گذاری را متوقف کرده و باعث تثبیت تغییرات هورمونی و در نتیجه بهبود سندروم می شود
مدروکسی پروژسترون (Depo-Provera). در موارد شدید این سندروم از این داروها برای درمان استاتات بیماری استفاده می کنند

سندروم پیش از قاعده ای از موارد کاربرد طب سوزنی است

علایم سندروم پیش از قاعده ای

- acne جوش
- anxiety اضطراب
- confusion اختلال شناخت
- depression افسردگی
- memory damage آسیب حافظه
- sexual damage آسیب جنسی
- chang sleep اختلال خواب

REFERENCES

1. Geo f . Brooks, janet s . Butel,Stephen A . Morse jawetz Medical Microbiology , 23 th ed , lange Medical

Books : Mc Graw – Hill . 2005 ; P: 403-417.

2. Ellen jo.Baron,Sydney M . Finegold , Bailey & scott's Diagnostic Microbiology, 10th ed,Mosby company.

2004;P:641-680.

3. J.Versteeg , Making a virus diagnosis , In : A Colour Atlas of virology , Wolf Medical publications 1995;P:9-37 .

پلی میوزیت

پلی میوزیت از مواردی است که طب سوزنی مفید است

میوزیت به معنای التهاب ماهیچه های بدن است. آسیب، عفونت یا بیماری خود اینمی تواند آن را ایجاد کند.

پزشکان ممکن است یک معاینه فیزیکی، تست های آزمایشگاهی، آزمایش های تصویری و بیوپسی عضله برای تشخیص میوزیت استفاده کنند. گزینه های دیگر شامل داروها، درمان فیزیکی، ورزش، گرمایش درمانی است

ضعف و ناتوانی عضلات از علائم اصلی میوزیت است. ضعف عضلات ممکن است واضح باشد و یا فقط با آزمایش معلوم شود. عضله ممکن است درد داشته باشد

درماتومیوزیت، پلی میوزیت و سایر میوزیت های التهابی باعث ضعف عضلات می شود که به آرامی طی هفته ها یا ماه ها بدتر می شود.

اغلب عضلات بزرگ بدن دچار ضعف و ناتوانی می شوند مثل گردن، شانه ها، باسن و کمر

معمولاً عضلات هر دو طرف بدن درگیر این مشکل می گردند

ضعف عضلات باعث افتادن فرد می شود و بلند شدن از روی صندلی و یا بلند شدن بعد از افتادن

برای فرد سخت می گردد

سایر علائم میوزیت که همراه با مشکلات التهابی دیده می شوند، عبارتند از
راش پوستی (جوش و دانه های پوستی) -
خستگی -

ضخیم شدن پوست دست ها -
سخت قورت دادن غذا -
به سختی نفس کشیدن -

در بیشتر موارد درد عضلات در اثر میوزیت نیست، ولی کشیدگی عضلات و یا بیماری های شایع
مثل سرماخوردگی و آنفلوآنزا باعث درد عضلات می شوند
اگر یک نوع ویروس باعث ابتلا به میوزیت شود، معمولاً سایر علائم عفونت ویروسی نیز دیده می
شوند مثل آبریزش بینی، تب، سرفه، گلودرد، تهوع و اسهال. آما علائم عفونت ویروسی، چند روز
یا چند هفته قبل از شروع علائم میوزیت، از بین می روند
درد عضلات را میالرژیا می گویند
برخی افراد مبتلا به میوزیت دچار درد عضلات می شوند، ولی بیشتر آن ها درد ندارند
درمان میوزیت بستگی به علت آن دارد.

برای درمان بیماری های التهابی ایجادکننده میوزیت، بایستی از داروهای سرکوب کننده سیستم
ایمنی استفاده کرد مثل: پردنیزون، آراتیوپرین و متوتركسات

معمولًا یک نوع ویروس باعث میوزیت ناشی از عفونت می شود و نیاز به درمان خاصی ندارد
میوزیت ناشی از باکتری شایع نیست و معمولًا برای جلوگیری از خطرات ناشی از پخش عفونت در
بدن، برای درمان نیاز به داروهای آنتی بیوتیک دارد
اگرچه رابدومیولیز به ندرت باعث میوزیت می شود، ولی باعث آسیب دائمی کلیه ها می گردد
وقتی که عضلات سریعاً تجزیه شوند، رابدومیولیز رخ می دهد
برای درمان رابدومیولیز بایستی در بیمارستان بستری شد و مایعات داخل وریدی (مثل زدن سرم)
را در مقدار زیاد به طور مداوم دریافت کرد

پلی میوزیت از موارد کاربرد طب سوزنی است

Symptom of polymyositis

علام پلی میوزیت

termor لرزش

fatigue ضعف

muscle weakness ضعف عضلات

muscle pain درد عضلات

Reference

- 1. Cherlene SM, Pedirck RN. Obsessive-compulsive. National Center of Continuing Education, 2003,**
from URL <http://www.google.com>.
- 2. Macini F, Gragnani A, Orazi F, Pietrangeli MG. Obsessions and compulsion: normative data on the Padua Inventory from an Italian non-clinical adolescent sample. Behaviour research and therapy, 1999, 37 (10): 919-925.**
- 3. Sanavio E. Obsessive-compulsive: The Padua Inventory. Behavior Research and Therapy, 1988, 26 (2): 169-177.**

