

اختلاجی ناروغی

Download from: aghalibrary.com

میرگی، صرعہ، Epilepsy

**Prepared by : Dr.Dost Mohammad
Sahar**

(صرعه) ياميرگی Epilepsy

تعريف:- Epilepsy عبارت دهغي ناروغي څخه دي كوم چي دناروغ دمغزو په قشري برخه كي يو غير نور مال برقي دسچارچ پيدا او ناروغ ته حركي، حسي، روهي او اتونوميك تشوشات پيدا كيږي.

Seizure بيا كه چيري په دماغ كي غير نور مال برقي عكسات رامنځته سي او د دماغي اختلاج سبب وگرځي Seizure بلل كيږي. په مقرر ډول سره د اختلاجاتو منځته راتگ ته ميريگي ويل كيږي.

اتیولوژی یا اسباب

نامعلوم صرع: د ۲۰-۵ کلنو په منځ کی رامنځته کیږی کوم
وصفی سبب نلری او نه هم بله neurologic abnormality
موجوده وی.

اعراضی صرع: په کوچنیانو کی د ولادی او perinatal
injuries کبله رامنځته کیږی.

او دوهم ډول یی د Metabolic disorders څخه عبارت دی چی
د الکولو د پریښودلو څخه رامنځته کیږی یا هم کیدای سی چی دا
ډول د Drug استعمال څخه رامنځته سی، uremia او
hypoglycemia یا hyperglycemia

ادامہ

پہ اسبابو کی ترضیض ہم رول لری کہ پہ تیرو دوه کلنو کی پی
ترضیض لیدلی وی باید فکر ورباندی وسی، تومور یا بل
Vascular diseases پہ Frontal ، Parietal یا ہم Temporal
Regions کی موجود وی
استحالوی ناروغی لکه Alzheimer's disease
او Infectious diseases لکه بکتریایی میننجیت، انسیفالیت،
سفلیس یا cerebral abscess موجود وی باید پہ نظر کی پی
ونیسو او پہ هر یوه باندی غور وکرو.

پوښتنه : ایا دمیرگیو دوره (Epileptic Seizure) او تشنج (Fit) یوشی دی، که ترمنځ یی توپیر شتون لری ؟

ځواب : هو ! مور په تولید ډول دمیرگیو د دورو پر ځای ډیر د تشنج یا د لاس او پښو د کږیدو اصطلاحات کاروو. ځینی خلک دی ډول دورو ته له خپله ځانه هم نومونه ورکوی لکه بلیک او تس، بلینکس او نور .

دا ټول اصطلاحات یوازی دیو ډول څرنګوالی لپاره کارول کیږی، یانی دا داسی څرنګوالی دی چی په کی نابیره بی کنټروله (بی واکه) غیر نور مال موضوعی برقی ډسچارج رامنځته کیږی، چی مور ورته دنړیوال طبی معیار له مخی د (Seizure) لفظ کاروو، چی د دوری مانا لری.

پوښتنه : آیا د (Seizure) یوه حمله یا دوره د میرگیو مانا لرلای شی ؟

خواب : د (Seizure) یوه دوره یا حمله دا مانا نه لری، چی شخص په میرگیو اخته دی، خو کله چی یو شخص دوه یا ډیری حملی ولری د میرگیو یا Epilepsy گومان پری کیږی.

پوښتنه : آيا ميرگي په هر ناروغ كې يو ډول دوري رامنځ ته كوي
ځواب : نه ! دوري څو ډولونه لري، چې دوه يې بنسټيز ډولونه دي،
چې دمكلمو او جزوي دورو په نامه يادېږي .

۱. مکملی دوری یا Generalized Seizures :

دا دوری هغه وخت رامنځ ته کیږی، چی کله غیر نورمال برقی
ډسچارج د دماغ په دواړو برخو کی پیدا شی او ناروغ پر تشنجی
څرنګوالی اخته کوی .

مکملی دوری بیا په خپل وار سره پر شپږو نورو ډولونو ویشل
شوی دی، چی موربی درو بنانتیا لپاره په لاندی ډول یادوو .

۱: حفف میرگی (Opetitmal) Absence Seizures:

1. په دی څرنګوالی کی ناروغ د څه وخت لپاره (۵ تر ۲۰ سکندو پوری) خپل حواس او هوښ دلاسه ورکوی .
2. دا دوری په ټولیز ډول څو ځلی دورځی په اوږدو کی رامنځ ته کیدلای شی.
3. د دی دوری په دوران کی د ناروغ سترگی Starring وضعیت لری.
4. شونډی یی غونجیری او کله زبینلو یا ژوولو په څیر حرکتونه لری.
5. که ناروغ د خبرو کولو په جریان کی وی خبری پریږدی.

۲: عضلاتی تشنج Myoclonic Seizures

په دی دوره کی د بدن په هره برخه کی اختلاجی (عضلاتی تشنجی)
(خرانگوالی رامنخ ته کیری، چی پیره په پینو او لاسونو کی وی .
د دوری (عضلاتی تشنج) وخت تر دوه سکینډو پوری وخت نسی.
دا دوری په تولید ډول د سهار د خوب څخه د پاڅیدو پرمهال پیری
رامنخ ته کیری .

Tonic phase



Clonic phase



© ADAM, Inc.

۳ : Atonic Or Astatic Seizures

د دی دوری پر مهال د ناروغ بدن نابیره شخیری، ډیره ستریا احساس کوی، چی گرځیدل یا نور حرکتونه، نه شی تر سره کولای .

په دی دوره کی ناروغ بنایي نابیره و لویزی، چی په پایله کی یی سر هم ډیر زخمی کیری

حکه چی همیشه یی سر د سختو شیانو سره ټکر کوی .

دا دوره په ټولیز ډول څو سیکنډه وخت نسی، چی وروسته تری عارضی عضلاتی تشنج هم رامنځ ته کیدلای شی .

۴: شدید تشنج Tonic Seizures

د دی دورو په دوران کی د بدن ټول غړی شخیری او د شخوالی تر څنگ شعور او حواس هم دلاسه ورکوی .
دا ډول دوری په ټولیز ډول د مغزو د شدیدو افتونو په پایله کی رامنځ ته کیږی، چی د دوری دوران یی ۱۰-۵ سگینډو پوری وخت په برکی نیسی

: Clonic Seizures ۵

په دی ډول دورو کی ناروغ د قوی یا شدید اختلاجی حالت سره مخ کیږی، چی په پوره بدن کی ورسره جتگی رامنځ ته کیږی، د دی دوری دوام لږ څه اوږد دی، د ۳۰ ثانیو نیولی آن تر دوه دقیقو پوری غزیدلای شی په ځینو ناروغانو کی بیا چی د لږ ډیر وخت لپاره دا څرنګوالی شتون لری.

٦ : tonic clonic seizures

دی دور ته grand mal یا لوی میرگی (صرع کبیر) هم وایی .
د دی دوری پرمهال په لومړیو کی د شدید تشنج څرنګوالی رامنځ ته
کیری او وروسته په کی رجف تشنج رایی.
څه ډول چی په دی څرنګوالی کی شدید او اوږدوالی ډیر وی ځکه
ورته د لویی دوری نوم ورکوو. دا دوری دیوی نه تر دریو دقیقو
دوام کولای شی په ځینو وختونو کی د ۳۰ دقیقی یا له دینه ډیر
وخت په برکی نیسی، چی بیا ورته status epilepticus وایی .

جزوی دوری partial seizures :

دا دوری هغه وخت پېښېږي، چې کله غیر نورمال برقی ډسچارج د دماغ په نیمه کره کې رامنځ ته شي .

جزوی دوری په دوه ډولونو ویشل شوی دی، چې د ساده او complex دورو

په نامه یادېږي په complex parital seizures کې د شخص په هوبښ کې

بدلون راځي او یا هوبښ د لاسه ورکوي او یا په کې خوبجن حالت غوره کوي.

په دې ډول حمله کې کیدای شي ، ناروغ ایرانونوونکی تکراری حرکتونه، لکه د

سترگو رپیدل، د عضلي دیوی برخی رپیدل او د خولې ځیني حرکتونه ولري.

دا ناروغان کیدای شي، ځیني شیان د کوټي څخه د باندې و غورځوي او پر

دیوال، کړکي پر شیشه گوزار (وار) ورکړي، لکه دې چې ویریدلی وي او یا

غوسه وي، خو دغه حملې یوازي په یو څو ثانیو کې له منځه ځي .


دمیرگیو ځیني ناروغان کیدای شي وړاندې د حملې څخه aura تجربه کړي .

:Aura

- یوه نا معموله خبرونه ده، چی شخص د پېښیدونکی حملی څخه خبروی، دا حقیقت کی simple partial seizures دی ، چی ناروغ په کی هوبښ دلاسه نه ورکوی.

د جزوی (قسمی) حملاتو یا partial seizures نښی په آسانی سره د نورو تشوشاتو سره غلطپیری دساری په ډول : هغه خوبولی حالت چی په complex partial seizures کی وی ، کیدای شی دنیمه سرخوړی (migraine) سره په چی همدغه شان خوبولی حالت وی غلط شی.

هغه نا آشنا حرکتونه، چی په partial seizures کی وی کیدای شی دا روا پی ناروغیو سره غلط شی.



اعراض او علايم

غيروصفي تغيرات لکه سردرد، دمزاج تغير، ستومانيا او اختلاجات
په myoclonic ډول کی مخکی له دی چی دوره شروع سی
جوټکی رامنځته کیری،

تشخیصیہ ٹکی

MRI ہغہ ناروغانو کی اجرا کیری چی محراقی neurologic symptoms یا focal seizures علایم ولری
او **ELECTROENCEPHALOGRAPHIC** پہ محراقی خرابوالی
کی کمک کوی
پہ لابراتوری او نورو ٹیرو نو کی CBC ، د وینی شکرہ، کبدی او
کلیوی معاینات، سفلیس،
نوٹ: ہیماٹولوژیکی او بیوشیمی ٹیرونی زموں سرہ د علت پہ
پیداکولو کی کمک کوی.

تداوي:

اول: عمومي اهتمامات او تدابير:

په عمومي اهتماماتو او تدابيرو کې د ډاکټر وظيفه داده چې ناروغ د بعدی حملاتو څخه وساتي او ناروغ دې ته آماده کړي چې د يو سالم شخص په صفت په ټولنه کې مسؤليت خپل ترسره کړی او همدی ترتيب ناروغ ته هدايت وکړی.

د ناروغ د دوباره حملاتو د ظهور د مخنيوی لپاره بايد ناروغ دې ته آماده کړی چې ځان د روحی فشار او بې خوبي څخه وساتي او په عمومي ډول روښنايي ته کتل، تلویزیون ته کتل او نا ارامه حوادثو څخه ځان وساتي.

ادامه.....

همدارنگه ناروغ ته توصيه چي د هغو کارونو د اجرا څخه ځان وساتي کوم چي د اوبو په شاوخوا کي تر سره کيږي. درپوري په جگو ځايونو کي د وظيفي تر سره کول او د واده په اوله شپه کي بي خوبي پيدا کېدل د ناروغی د حملاتو د ظهور باعث گرځي. اما خپله واده کول د ناروغی په مسير کي کوم مثبت او منفي اثر نلري.

ادامه.....

حمل او حامله داری د ناروغی د حملو خطرات زیاتوی، په ماشومانو کی د مرگی سیر هغه وخت خراب انزار لری کوم چی فامیلی تاریخچه موجوده وی اما که چیری کوم عضوی تکلیف د ناروغي سببی عامل وی نو په دې صورت کی د ناروغی انزار هم بڼه دی په کمی اندازی سره سپورت کول کوم معذرت ناروغ ته نه پیدا کوی اما شدید سپورت کول مضر ثابتیری.

دوهم طبي تداوي:

د طبي تداوي څخه زموږ دوه اساسي هدفونه:

۱- د اضافي برقي Discharge د پيداكيدو څخه مخنيوی كوي.

۲- نهی كول د Post Tatanic

په قسمي او ثانوي عمومي tonic-clonic seizures كی

carbamazepine, phenytoin يا valproic acid د

phenobarbital يا primidone سره يو ځای وركول كيري

فقط دوی دواوی يو ځای وركوو .

Gabapentin, topiramate, lamotrigine, oxcarbazepine,

levetiracetam, او zonisamide نوي antiepileptic drugs

دی چی د زړو ځای یی نه دی نیولی

