


دکندهار دعامی رو غتیا ریاست
داکتر مامون (طاهری) درو غتیایی علوم موائستیوت

دعالی نرسنگ خانگه

په عقلی عصبی سیستم موثره دواګانی



Download from:aghlibrary.cm

کال ۱۳۹۷

لیکنہ: استاد محمد ظاهر میوند (نسیمی)

خوب راوبرونکی، مسکن اوداضطراب ضد درمل Hypnotic, Sedative, Anti-Anxiolytic Drugs

مسکن درمل :- مسکن درمل دهجه درملو خخه عبارت دی چی حرکی فعالیت کموی او دخوب له تولیدخه پرته ارامی منخته راوبروی دوی داضطراب ددرملنی لپاره هم استعمالییری .

خوب راوبرونکی درمل:- خوب راوبرونکی درمل دهجه درملو خخه عبارت دی چی خوب منخته راوبری (تولیداودم) طبیعی لمیدلی خوب سره ورته والی لری دوی خوبی (دخوب دنشتولی) ددرملنی لپاره استعمالییری دانسانانوپه منخ کبني دخوب پاییست اوبدول توپیرلری عمردخوب پرمقدار او عمق مهمه اغیزه لری خوب په زرو خلگوکبني کمیری خوب دبدن داستراحت ورکولولپاره دیرضروری دی . انسان تقریباً خپل دژوند ۱/۳ حصه په خوب کبني تیروی بی خوبی دنارو غانو دتعريف پراساس پربیدیلو باندی دفتر اوتوان نه درلولد یادنکافی خوب خخه عبارت دی دبی خوبی تول دولونه و درملنی ته ارتیانلری کیدای شی چی دخوب خخه مخکی گرم حمام کول . دشپی له طرفه دچای قهوی او سگریت نه خکول دخوب په درملنه کبني کومک کوي . امادو امداره او اذیت کوونکی بی خوبی دخوب دراوبرونکو درملو (Hypnotic) په واسطه سره تداوی کمیری کوم وخت چی درمل تحویز ضروری وي نوکوبنبن باید وشی چی په کمترین ممکنه مقدار او دلندیمودی لپاره (بیوی هفتی کم وخت) درمل توصیه شی

دمسکنو، خوب راونکو او اضطراب ضد درملو صنف بندی

دا درمل په څلورورو پونوباندی ویشل شوی دی .

Benzodiazepine :A

1. Diazepam
2. chlordiazepoxide
3. Flurazepam
4. Lorazepam
5. Oxazepam
6. Nitrazepam
7. Alprazolam

Barbiturates :B

- 1) Phenobarbital
- 2) Pentobarbital
- 3) Secobarbital

دا ګروپ درمل دجانبی عوارضوله کبله دخوب راونکو، مسکن ضد اضطراب درملو په حيث نه استعمالییری .

C: نوی درمل

Bozpiron

Zolpidem

D: متفرقه درمل

- chloral Hydrate
- Meprobamate
- Gutethimide
- Hydroxyzine
- promethazin
- Diphenhydramine

دگروپ مشتقات (BDZs) Benzodiazepine

داگروپ درمل دمسکن، خوب راورنکی اواضطراب ضددرملوپه حیث دمصرف ترینه درملودجملی خخه دی داگروپ درمل نسبت وباربیتورنوته پیرمصنون دی خکه بی نو دخوب راورنکو درملوپه حیث دهعوای نیولی دی تقریباً ددی گروپ ۲۰ ډوله مختلف مشتقات په طبات کی استعمالیروی .

Pharmacokinetics

دبنزودیازپین دگروپ درمل دخولی له لاری ترتطبیق وروسته په بنه ډول سره دهضمی جهازله لاری جذب اوپول بدن ته توزیع کیروی ددی گروپ درملوداغیزی دوام مختلف دی دبعضوداغیزی دوام کم او دبعضوداغیزی دوام زیات دی .

مثلاً Diazepam او chlordiazepoxide داغیزی دوام زیات یا اورد دی ولی Oxazepam داغیزی دوام لنډ دی . دپلاستنایی مانعی خخه تیریروی او دپیستور ګوله لاری اطراح کیروی . دبنزودیازپین دگروپ درمل لاندی فارمکولوژیکی اغیزی منځ ته راوری .

۱: دعصبي سیستم داضطراب یانارامی دکموالی اغیزی :- په لمقدار سره ددی درملوتطبیق داضطراب دکموالی سبب کیروی .

۲: مسکن خوب راورنکی اغیزی :- دادرمل په کوچنی تره دوزونو دتسکن دارامولواوپه لوی تره دوزونو دخوب سبب کیروی .

۳: دتشنج ض DAGIزی :- خنی بنزودیازپینونه دتشنج ض DAGIزی منځته راوری او په عضلي تشنج کی استعمالیروی لکه دتیتانوس تشنج

۴: انسٹیتک اغیزی :- خنی بنزودیازپینونه لکه Diazepam دانستیزیاڅخه مخکی درمل (I.M) او دعمومی انسٹیزیادتولید لپاره (I.V) استعمالیروی .

۵: متفرقه اغیزی :- ددوی اغیزی پرتنفسی سیستم او قلبی او وعائی سیستم لبرازښت لری په لورودوزونو دتنفسی انحطاط برادی او دوینی دفسار دکښته کیدو سبب کیدای شی دوی کولای شی دپیپتیک فرحتاوه نارو غانوکښی دشپی له پلوه دمعدى H.C.L ترشح لړ کړی .

متفرقه اغیزی ددی گروپ درملونه دنمايندنه په حیث مطالعه کوو .

indication

Diazepam دبی خوبی او اضطراب په کوتاه مدتہ درملنہ status Epileptics په حالت ،دالکولوپر بینودپه وخت کی همدارنگه دانستیز یا خخه مخکی درمل په ډول او دعوموی انسٹیزیاتولیدلپاره استعمالیروی chlordiazepoxide زیاتره داضطراب په درملنہ کی استعمالیروی oxazepam

contra indication

دا درمل دتنفسی انحطاط کی نه تطبيق کیری تنفسی عدم کفایه همدارنگه دلیونتوب په نارو غیوکی ، دینی په عدم کفایه دحامگی په دوران کی ، دشیدورکونی په دوران کی ، مزمون تنفسی نارو غیوکی او په الكولستانوکی باید په دیر احتیاط سره تطبيق شی .

side Effects

ددی درمل جانبی اغیزی دسرگیچی ، دماغی اختلال ، Hypotension دوینی تشوشات ، درویت تشوشی ، دادرار احتباس ، هضمی تشوشات ، دلعاویه غدوات تشوشات او vertigo څخه عبارت دی .

Dose

Diazepam په اضطراباتوکی: - کاهلانوته 2mg دری واره دورخی ورکولای شوچی د درمل مقدار دضروریت پراساس 5-10mg پوری لوړولای شو .

بیخوبی چې اضطراب سره یوځای وی :- کاهلانوته 5-15mg داستراحت په حالت کی توصیه کیری کوچینان چه په پرله پیسی څوشپی و پرونکی خوبونه وینی (Night terror) او یادخوب په وخت کی پر لاری ټی یوازی دشپی لخوا 1-5mg توصیه کیری .

فیبریل اختلالات : - چې دتبی څخه ناشی شوی وی 0,25mg/kg وزن بدنه دوریدی زرق یا 0,5mg/kg وزن بدنه دمحول په ډول دریکتم له لاری توصیه کیری .

داختلاجاتو درمنلی لپاره : - و کاهلانوته 10-20mg او ماشومانوته 0,5mg/kg وزن بدنه توصیه کیری

دپرمپدیکیشن لپاره : - کاهلانوته 10mg او کوچنیانوته 0,3mg/kg وزن بدنه دوریدی دلاری ورکول کیری . د 2mg- 5mg او 10mg تابلیتونه او 2ml امپولونه چې 5mg/ml اغیزمن ماده لری د تجارت په بازارکی موجود دی .

- کاهلانوته 10-25mg چې ورخ کی 1-3 کسری دوزونوسره نظر و ناروغ ته فرق Chlordiazepoxide کوی ماشومانوته نه توصیه کیری . د تجارت په بازارکی د 10mg - 5mg او 25mg تابلیتونه په شکل موجود دی .

Oxazepam - کاهلانوته 15-10mg دوه دانی دری واره دورخی توصیه کیری نوموری دواماشومانو ته نه توصیه کیری دتجرات په بازارکی 15mg تابلیتونوپه شکل موجود دی

انتاکونستونه Benzodiazepine فلومازنیل (Flumazenil)

فلومازنیدبنزودیازپین یوانتاکونست دی چی په مسابقی شکل دهغپراخذوباندی اغیزه کوی که چیری دادرمل په هغونارو غانوکښی چی دبنزودیازپین ترشیداغیزی لاندی وی تطبیق شی 5 دقیقوپه موجوده کښی نوموری ناروغ دبیداره کیدوسیب کیری .

indication

تر عملیات وروسته دبنزودیازپین اغیزودله منخه ورلوپه خاطر دتشخیصه پروسیجر ونوخه وروسته چی په هغه کښی دبنزودیازپین لوردو زرنه تطبیق شوی استعمالیبری .

contra indication

دا درمل دژوندپه تهدیدونکو حملاتو کښی چی دبنزودیازپین تردرملنی لاندی وی نه تطبیق کیری .

side Effect

دلبدی ، استفراق ، اضطراب ، حساسیت او تاکی کار دیا .

Dose

200 مایکروگرامه د 15 ثانیوپه موده کښی دوری دله لاری وروسته دهری دقیقی په موده کښی 100 مایکروگرامه دضرورت په صورت کی ورکول کیری معمول دوزی 300-600 مایکروگرامه دی اواعظمی دوزی 1mg دی

نوی خوب را ورنکی او داضطراب ضد درمل Zolpidem او Buspiron

که خه هم نوموری درمل غیری بنزودیازپین خوب را ورنکی درمل دی خودبنزودیازپین دمربوطه اخذوپریوہ برخه باندی اغیزه کوی اختلال ضدیا عضلی رخاوت ورکونکی خاصیت نلری ددی درمل خخه درمل دقطع اعراض نه دی لیدل شوی دبی خوابی بیرته راگر خیل لر لیدل شوی دی . نومورو درملو خخه دوامداره استعمال په صورت کی تحمل لریا هیچ په وجودنه راھی دمعدى معائی لاری په چتکی سره جذبیروی ناگواره عوارض ویرونکی خوبونه ، نارمی ، سردردی ، دمعدى معائی تشوشاتو ګنگست اودورخی په جریان خوب الودگی .

indication

داضطراباتو په کوتاه مدتنه درملنې کښی استعمالییری خوپه نظرکښی باید ولرو چې ده ګه اغیزی کیدای شی دوى هفتی په برکښی ونيسي .

contra indication

دحاملګي په دوران کي ، دشیدورکونکي په دوران کي ، په صرع يا ميرگي .

احتیاط :- ددرملنی په جریان کی په ماشین باندی دکارکولوڅخه باید پر هیزووشي دینی او پسندور ګوپه عدم کفایه کی په احتیاط سره توصیه شی .

side Effect

سردردي ، ګنګسيت ، عصبانيت ، او دسر دسپکوالی احساس .

Dose

له اتلس کلنی څخه و غټه اشخاصوته 5mg دوه يا دری واره دورخی و روسته بیاده رو دویادر وورخودتیرید و په تعقیب د درمل مقدار دار تیا پر اساس زیاتیری معمولی ورخنی مقدار 15-30mg دی .

indication

د بیخوابی په درملنې کي استعمالییری .

contra indication

دا درمل په تنفسی او عصبي عدم کفایه کښی او همدارنګه په وخیموکبدی او کلیوی نارو غیوکی نه استعمالییری او همدارنګه دحمل په دوران کي نه توصیه کیږي .

side effects

ددی درملو جانبی عوارض Hypotension ، دخولی و چوالی ، بی حالی او تنفسی انحطاط دی .

Dose

ددی درمل ورخنی دوز کا هلانوته 0,5-2mg پوری دی .

باربیتوریتونه (Barbiturates)

په پخوازمانوکنی داگروپ درمل یوازنی خوب راورونکی درمل وه چی استعمالیدل خونن ورخ دهغوحای بنزو دیازپین داگروپ درملو نیولی دی . باربیتوریتونه سره له دی نن ورخ هم دصرع په درملنه کی لکه فینوفار بیتال اوپاپه انسیزیاکنی لکه تیوپننال استعمالیلری خودخوب راورونکی درملوپه حیث دلاندی دلایله کلنه نه استعمالیلری

- ۱: درملنی اوسمی دوزونترمنخ یی حکم دی دسمیت اومرگ سبب گرخی .
- ۲: زیاتره ناروغان ددی درمل څخه سؤاستفاده کوی او داعتیاد سبب کیروی اعتیاد او فزیکی وابستکی تولیدوی چی دهغه درملنه مشکله ده .
- ۳: دینی دمايكروزمال انزايمونودتبه سبب کیروی چی په نتیجه کی د درمل متقابل اغیزی تولیدوی .

Anti- Histamine

يوتعداد انتی هیستامینوکونه لکه ډافین هیدرامین خوب راورونکی اغیزی لری خوددی ترڅنګه زیات شمیرجانبی عوارض هم لری دا درمل دانٹی هیستامینوکونوپه برخه کی مطالعه کیروی .

Hydroxyzine

اصلایوانتی هستامینک درمل دی خوارامونکی یا داضطراب ضداغیزه هم لری دیرکم اعتیاد تولیدوی معمولاً دکاهلانولپاره داضطراب ضد درمل په حیث $50-100\text{mg}$ په اندازه تطبيق کیروی . جانبی اغیزی او مضاد استطباب یی دنوروانتی هیستامینوکونوسره مشابه دی اوپه خپل مربوطه فصل کنی مطالعه کیروی .

دخوب راوونکو او اضطراب ضددرملوپه مقابل کی اعتیاد

په عمومی دول سره ویلای شوچی که چیروی هر خوب راورونکی او داضطراب ضددرمل او رو دی مودی لپاره استعمال شی درمل وابستکی یا اعتیاد دمنځته راوړی که چیروی درمل قطع کړل شی د درمل دقطع اعراض چی داعصابو داخلل ، اضطراب ، بی خوابی ، نارامی او نورو څخه عبارت دی رامنځته کیروی . په همدي خاطرپه هره بیخوابی او اضطراب کنی بایددا درمل تطبيق نکړل شی او کونښن بایدوشی چی اویل بیخوابی او اضطراب دنورولار او طریقو په واسطه سره تداوی کړل شی که چیروی ددی درملو واستعمال ته خاصه اړتیا پیداشی نو پدی صورت کنی بایددرمل په کمترینه ممکنه مقدار او دلنډترینه مودی لپاره توصیه کړل شی .

بنزو دیازپین په یو معتاد کنی ددرمل ترپریښو دلووروسنه ددرمل دقطع سندروم یا اعراض کیدای شی چی د ۳ ورخ څخه تر ۳ هفتويپوری را خرکند شی .

درملو داعتیاد پریښو دل Benzodiazepine

۱: مربوطه درمل ددی گروپ دیوبل درمل ترجیحا Diazepam په مؤثره دوز سره دشپی له خواتبدیل کړل شی .

۲: Diazepam دوز دی په تدریجی دول سره په هر دو یادرو هفتوكنی $2-2.5\text{mg}$ پوری کم کړل شی .

۳: بهتره ده چه د درمل قطع په کراری سره او اهستکی سره صورت ونیسی .

۴: د درمل قطع په هغه دوز پوری چی شخص په هغه اخته وی او هم په خپله په شخص پوری مربوط دی

ممکن دخلورو هفتوكنه تریوکال پوری دوام وکړی .

څلوروم فصل

په دماغي نارو غيوکنې مستعمل درمل Anti-Psychotic and Anti-Schizophrenic Drugs

- ۱: په دماغي نارو غيوکنې مستعمل وصفی درمل
- ۲: په دماغي نارو غيوکنې مستعمل غيري وصفی درمل

۱: په دماغي نارو غيوکنې مستعمل وصفی درمل

1. chlorpromazine
2. Fluphenazine
3. Haloperidol
4. Loxapine

indication

Chlorpromazine او Haloperidol کنتروليدونکی استفراق اور اگرخیدونکی هکک کښی داستفراق ضداوھکک ضد درمل په حیث سره استعمالیږی او همدارنګه Laxapine په مختلفه دماغي نارو غيوکنې استعمالیږی او مستعمل درملوپه حیث په تعقیبه درملنه کی استعمالیږی ځکه ددی درملویوزرق دری هفتی حتاپه یومیاشت کی کفایت کوي.

side Effect

Hypotension او همدارنګه Hypothermia، دخولی و چوالی، دیپزی داحتقان، Tachycardia، قبضیت، دادار احتباس، دوزن زیاتوالی، دحیض تشوشت، Gynecomastia او Allergic Reaction، ددی درملو جانبی عوارض دی

contra indication

په هغه کوماکنې چې د عصبی سیستم د انحطاطی درملو نتطبیق له کبله منئته راغلی وي نه استعمالیږی. دحاملکی په دوران کی نه تطبیق کیری په تنفسی نارو غيوکنې، په قلبی و عائی نارو غيو، Epilepsy حادو انتانانوکی دشیدو و رکولوپه دوران، کبدی او کلیوی عدم کفایه په وخت کښی په دیر احتیاط سره تطبیق شی

Dose of chlorpromazine

کلورپرومازین کا هلانوته 75mg په واحد دوز سره دشپی لخوايا 2-3 کسری دوزونوسره و رکول کیری. د مؤسنو خلکوته د کا هل دوز نصف دوز توصیه کیری. په حادو حالاتوکنې د عمق عضلی زرق په شکل کا هلانوته 25-50mg دوز په اندازه توصیه کیری. ما شومانوته ددی درمل مقدار 0,5mg/kg وزن بدنه و رکول کیری. د تجارت په بازارکی 25mg او 100mg تابلیتونه او هم د شربتو په ډول چه 5ml بی د 25mg موثره ماده لری موجود او هم یې امپول 2ml موجود دی چه یوملی لیتری 25mg موثره ماده لری.

گرام فی کیلو گرام وزن بدنه و رکول کیری.

Dose of Loxapine

وکاهلانوته دورخی ده 50-25mg پوري ورکول کيرى اودارتىپه وخت کى دورخی ده 60-100mg پوري هم توصيه کيرى .

په دماغى ناروغىوبىنى مستعمل غىرى وصفى درمل

په دى گروپ کبى Risperidone، clozapine اوپوتعداد نورودرمل شامل دى ددى درملوبىوالى په دى کبى دى چە دناروغ په واسطه بنه تحمل کيرى اوخارج اهرامى اعراض يى كم دى خودنوروجدى جانبى عوارضوپه خاطرددى درمل استعمال محدودكېل شوی دى .

فقط هغه وخت استعماللىرى چى نورمعمولى اووصفى درمل لكه chlorpromazine اودهغه مشتقات مؤثره نه وى ھكە clozapine ممکن داگرانولوسايتوزيرسبب شى ددى درملوتطبق په قلىي په عدم كفایه، شدیدوكبدي، كليوى اودونىنى په ناروغىواو همدارنگه حاملگى په دوران کى دشيدو ورکونى په دوران کبى مضاداستطباب دى

Dose of clozapine

وكلوزاپين ورخنى دوز 50-300mg دى چى په منقسىمودوزونوسره ورکول کيرى لومېرى ورخ 12,5mg يويادوه واره دورخى دوهمه ورخ 25mg يويادوه وار دورخى ورکول کيرى .

Dose of Risperidone

درپسپيريدون ورخنى دوز 2-6mg دى چى په يوه يادوكسرى دوزونوسره ورکول کيرى لومېرى ورخ 2mg په يوه يا دوه كسرى دوزونوسره دوهمه ورخ 4mg په يوه يادوه كسرى دوزونوسره ورکول کيرى

دھفغان ضددرمل Anti-Depressant Drugs

Anti Depressant Drugs

Tricyclic Anti Depressant (TCA)

Drug Name	Dose	Drug Form
Amitreptylin	10-200mg	10,25,50mg
Imipramin	10-150mg	10,25mg
Clomipramin	12.5-150mg	10,25,75mg
Dosulepin	25-225mg	25,75mg
Doxepin	10-300mg	10,25,50mg
Nortriptylin	10-150mg	10,25,50mg
Maprotylin	25-150mg	25,75mg
Trimipramin	75-300mg	25mg

Selective Serotonin Reuptake Inhibitor (SSRI)

Drug Name	Dose	Drug Form
Citalopram	10-80mg	10,20,30,40mg
Es-citalopram	5-80mg	5,10,15,20mg
Fluoxitin	20-60mg	20mg
Fluoxamin	50-300mg	50,100mg
Paroxitin	10-50mg	10,20,30mg
Sertralin	50-200mg	50,100mg

Nor Adrenalin Reuptake Inhibitor (NARI)

Drug Name	Dose	Drug Form
Endronax	4-10mg	4mg

ترایسکلیک (Tricyclic) مشتقات

ددي گروپ درملو لپاره دترایسکلیک اصطلاح یوغلط نوم دی خکه داتول مرکبات دری کریزنه دی ھینی دوه کریزدی لکه اموکسایپین اوھینی خلورکریزدی .

Pharmacokinetics

دغه درمل په اسانی دھضمی کانال دلاری دوینی دوران ته داخلیوی څرنکه چی په شحم کبni دانحلال بنه قابلیت لری نوله دی کبله په عصبی نسج کی په بنه ډول توزیع کیری وروسته له هغه چی په کبدکی په استقلاب ورسیروی وبولی لاری څخه اطراح کیری .

دتاير ميختانيکيت

کله چی دعصبی حجراتوپه synapse کبni نيروتراںسمېټرونې لکه Serotonin، Nor Adrenalin او Dopamine افرازشی یومقداردمربوطه اخذو دتبه سبب کرخی یومقداری Mono-Amine-oxidase انزایم په ذريعه تخریبیروی اویومقداری ده ګه نیوروونوپذريعه کوم چی دنوموری مونوامینونوادافراز سبب کرخی دوباره خذبیروی مکرکله چی ناروغ ته Tricyclic مشتقات تطبيق شی دنیوروونوپه ذريعه دمونوامینونوادازه Reuptake څخه مخنيوی کوي اوپه دی ډول په عصبی نسج کی دمونوامینونوادازه زیاتریوی اوپه ناروغ کبni دعصبی سیستم انحطاط حالت له منځه څي tricycles ګروپ څینی درمل په لاندی ډول دی .

امي تریپیتیلين يا Amitriptyline

Indication

Depressions په درمانه کبni استعالیوی همدارنکه amitriptyline په نیوروپاتی درد دنوکی هم تجویز کیدای شی داکروپ درمل په کوچنیانوکبni enuresis یا دشپی ادرارکوی اوپه مؤسنولکوکبni دبولوپه نه کنترول کبni دخوب پرمھا ورکول کیری او 6-3 هفت پوری ادامه پیداکوی .

contra indication

دزره دعطلی احتشاء Epilepsy، Glaucoma، Cardiac Arrhythmia دشیدو ورکونکی په وخت کبni او په ناروغانوکبni په دیر احتیاط سره تطبيق کړل شی . pregnancy

side effect

دخولی وچوالی ، دلبدي ، قبضیت ، تبول عسرت ، خولی کول ، رعشه Hypotension، Tachy cardia ، جلای عکس العملونه بی جانبی عوارض دی .

Dose

کاھلانوته ددورخی 50-75mg په 2-3 کسری دوز و نوسره ورکول کیری مکرو مؤسنواشخاصوته دبور تی مقدار نیمايی مقدار توصیه کیری دتحمل په حالت دورخی 150-200mg توصیه کیری ماشومانوته نه توصیه کیری .

ایمیپرامین یا Imipramine

ددمی درمل تول خصوصیات Amitriptyline ده یه دول سره دی .

کلومیپرامین Clomipramin

ددمی درمل تول خصوصیات اودوزد Amitriptyline یه دول سره دی .

Mono-Amino oxidase Inhibitors

ددغه گروپ درمل هم د Anti-Depressant درملو دجملی څخه دی .

دتاشر میخانیکت

دغه درمل یه عصبی synapse کښی دمونوامینولکه Dopamine و Nor Adrenalin، serotonin دنخرب څخه د Mono Amino oxidases دانزایم پذريعه مخینوي کوي يعني نوموري درمل د Amino oxidase انزایم فعالیت نهی کوي اویه دی دول یه عصبی نسج کښي Dopamine غلط دزياتوالی سبب کرڅي اویه دی دول د Depression اعراض کمیری

Pharmacokinetics

دغه درمل دخولی دلاری طبیق کیری دکولمو دجار څخه دوینی دوران ته جنپیری له توزیع څخه وروسته یه کبدکی یه استقلاب رسیری اوپیوپی سیستم دلاری دعضویت څخه اطراح کیری .

فینالزین یا Phenalzine

دغه درمل د Anti-Depressant درملو له جملی څخه دی دادرمل کیدای شی چی دانحطاط یه هغونارو غیوبکښی چی Tricyclic Anti-Depressant درملو ته ځواب نه ورکوی استعمال شی دوی یه ځانکری دول دنایا اوبي جهته ویری یه بی نظمی کښی چی دانحطاط سره یوځای وي کتور دی چی د دنارو غی یه درملنه کښی استعمالیږي .

contra indication

یه کبدی نارو غیو، یه کلیوی نارو غیوکی، دحاملكی یه دوران کی، دشیدو ورکونی یه دوران کی نه توصیه کیری . یه قلبي نارو غیو، Epilepsy، Diabetes او دوینی دلوحی یه تشوشاتوکی یه احتیاط سره تطبیق شی .

side effects

کنکیست، دخولی و چوالی، سردردی، قبضیت، خستکی، اذیما، شریانی هاییوتینین .

Dose of Phenalzine

کاهلانوته دورخی 30mg یه 1-2 کسری دوزونوسره ورکول کیری دتحمل یه صورت کی دروخی یه 2 کسری دوزونوسره توصیه کیری .

Iso carboxazid

ددي درملوتول خصوصيات phenelazine يه دول سره دی .

دسيروتونين ددوباره جذب انتخابي نهي كونكى درمل

Selective Serotonin Reuptake Inhibitor (SSRI)

دакروپ درمل يه انتخابي بول ددماغ يه نيارونونوكى serotonin ددوباره جذب خخه مخنيوي کوي اودهعه سويه د synaps يه مجاورت کبني زياتوى دادرمل دترای سکلیک درملوبر عكس دنور ادرینالين سويه يا اندازه نه زياتوى . دسيروتونين ددوباره جذب انتخابي نهي كونكى درمل عبارت دى له Fluoxetine,paroxeten,sertraline,Fluvoxamin

Fluoxetine

indication

يه خفگان اووسواسه ،کى استعماليرى .

side Effects

يه وينه کي دکلوكوزدسوی تغيرات ،دوينتنانوتوبيدل ،هضمی تشوشات احساسیت

Dose

يه نظرکي باید وي که ناروغ مخکي ددماغي انحطاط ضد درملويعنى دمونوامينواوكسديزنھي کونكى درملوتردرملنى لاندى وي درملنه يه Fluoxetine سره باید دوي هفتى دنومور و درملوتقطع کيدو وروسته شروع شى اوبر عكس که دفلوكزيتين ترتداوي لاندى باید يوه هفته دهげه قطع کيدو خخه تيره شى وروسته درملنه يه مونوامينواوكسديزنھي کونكى درملسره شروع کري . يه دماغي انحطاط کبني لومرى دغتانولياره 20mg دورئي تطبق کيرى ترمناسي وققى وروسته درمل مقدار دورئي تر 60mg بورى زياتوب ييداکوي دادرمل و ماشومانوته نه توصيه کيرى .

منه ميوندنسيمي

**Download
from:aghalibrary.cm**